



Vaccinazione di richiamo con un vaccino a mRNA (Pfizer/BioNTech, Moderna)

I vaccini a mRNA proteggono molto bene da forme gravi di COVID-19 con ospedalizzazione. Con il passare del tempo, a seconda dell'età e della variante del virus, questa protezione può diminuire. La protezione da forme lievi della malattia e dalla trasmissione del virus diminuisce per tutti con il passare del tempo. A seconda della variante, ciò può avvenire più o meno rapidamente. Per questo raccomandiamo una vaccinazione di richiamo a tutte le persone a partire dai 12 anni.

A che cosa serve la vaccinazione di richiamo?

La vaccinazione di richiamo ricorda al sistema immunitario l'agente patogeno. Una protezione vaccinale aumentata viene ripristinata e prolungata.

A chi è raccomandata la vaccinazione di richiamo?

Una vaccinazione di richiamo è raccomandata a tutte le persone a partire dai 12 anni.

• Persone a partire dai 65 anni

Per questa fascia d'età una vaccinazione di richiamo è raccomandata in primo luogo per una migliore protezione individuale possibile da un decorso grave della malattia da COVID-19 con ospedalizzazione, in particolare per:

- le persone a partire dai 75 anni;
- le persone a partire dai 65 anni affette da malattie croniche ad altissimo rischio¹ di decorso grave della malattia da COVID-19;
- i residenti e le persone assistite in case per anziani, case di cura o centri diurni per anziani.

• Persone tra i 16 e i 64 anni

Nelle persone sotto i 65 anni, la vaccinazione di richiamo aumenta la protezione dalle infezioni e dai percorsi spesso lievi e raramente gravi della malattia e dalle sue conseguenze (p. es. conseguenze a lungo termine della COVID-19, assenza dal lavoro). Può anche contribuire a ridurre temporaneamente la diffusione del virus. La raccomandazione vale in particolare per:

- le persone particolarmente a rischio sotto i 65 anni affette da malattie croniche ad altissimo rischio¹ di decorso grave della malattia da COVID-19;
- i residenti e le persone assistite sotto i 65 anni in case per anziani, case di cura o centri diurni per anziani;
- il personale sanitario a contatto diretto con i pazienti e il personale di assistenza delle persone particolarmente a rischio.

La vaccinazione di richiamo è raccomandata anche alle donne in gravidanza a partire dal secondo trimestre di gravidanza e a quelle che allattano.

• Adolescenti tra i 12 e i 15 anni

Per questa fascia d'età una vaccinazione di richiamo è raccomandata se si vuole aumentare la protezione da un'infezione e dalle forme lievi della malattia e ridurre il rischio di trasmettere il virus ai contatti stretti (membri della stessa economia domestica).

Quando va somministrata la vaccinazione di richiamo?

La vaccinazione di richiamo è raccomandata a partire da 4 mesi dopo l'immunizzazione di base completa con un vaccino a mRNA, ossia dopo:

- due dosi di un vaccino a mRNA; o
- un'infezione confermata da coronavirus + una dose di vaccino a mRNA a distanza di almeno 4 settimane (indipendentemente dall'ordine).

Se è stata confermata un'infezione da coronavirus dopo l'immunizzazione di base completa con un vaccino a mRNA si applica quanto segue:

- in caso d'infezione entro 4 mesi dall'immunizzazione di base si raccomanda una vaccinazione di richiamo 4 mesi dopo l'infezione;
- in caso d'infezione dopo più di 4 mesi dall'immunizzazione di base, una vaccinazione di richiamo in genere non è attualmente necessaria. Per gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni che hanno contratto un'infezione a partire da 4 mesi dopo il completamento della vaccinazione di base, una vaccinazione di richiamo non è raccomandata.

Con quale vaccino e con quale dosaggio è somministrata la vaccinazione di richiamo?

Nei limiti del possibile, per la vaccinazione di richiamo va utilizzato lo stesso vaccino somministrato per l'immunizzazione di base. Se tale vaccino non è disponibile si può anche fare ricorso all'altro vaccino a mRNA. Se per l'immunizzazione di base sono stati utilizzati vaccini a mRNA differenti, la vaccinazione di richiamo può avvenire con uno dei due vaccini.



Alle persone tra i 18 e i 29 anni è raccomandata preferibilmente la vaccinazione di richiamo con il vaccino di Pfizer/BioNTech. Alle persone tra i 12 e i 17 anni è raccomandata la vaccinazione di richiamo con il vaccino di Pfizer/BioNTech.

Con il vaccino di Pfizer/BioNTech, per la vaccinazione di richiamo è somministrato la stessa dose dell'immunizzazione di base. Con il vaccino di Moderna, per la vaccinazione di richiamo la dose è dimezzata.

Dove posso farmi vaccinare?

L'attuazione compete ai Cantoni. Per informazioni su dove potete registrarvi e farvi vaccinare, consultate il sito Internet o chiamate l'Infoline del vostro Cantone (www.ufsp-coronavirus.ch/cantoni) oppure rivolgetevi al vostro medico o farmacista.

Per il resto, alla vaccinazione di richiamo si applicano le stesse informazioni dell'immunizzazione di base, consultabili nel promemoria «*Informazioni generali sulla vaccinazione anti-COVID-19 con un vaccino a mRNA*».

