



作为加强针追打一款 mRNA 疫苗(辉瑞 / BioNTech, 莫德纳)

mRNA 疫苗可以很好地预防出现不得不接受住院治疗的 Covid-19 重疾。周岁此类疫苗的保护作用视年龄和病毒变种不同会随着时间的推移而减弱。周岁对于所有人，其所接种的此类疫苗对轻症和病毒传播的保护作用也都会随时间的推移有所下降。视病毒变种的不同，这种情况出现的时间可能更早或更晚。因此，我们建议所有年满 12 周岁的人都追打一款此类疫苗的加强针。

为何要追打疫苗加强针？

通过追打疫苗加强针，得以唤醒免疫系统对病原体的记忆，从而令接种的疫苗的保护力度得到提高、恢复或延长。

建议哪个群体追打疫苗加强针？

追打疫苗加强针的建议适用于所有年满 12 周岁的人。

- 年满 65 周岁的人
对于此类人群，建议其追打加强针主要是为了最佳地保护他们，预防其出现因 Covid-19 引起的重疾而不得不接受住院治疗，周岁此建议特别针对：
 - 75 周岁以上的人；
 - 65 周岁以上的、罹患慢性病的 Covid-19 重疾高危¹人群；
 - 养老院、护理院和老年日托机构的居民和被护理人员。
- 年龄从 16 至 64 周岁的人
对于年龄低于 65 周岁的人群，追打加强针有助于提高对感染、常常还有轻症以及罕见重疾及其后遗症 (例如 Covid-19 的长期后遗症、缺勤) 的预防。它还有助于在短期内缩小病毒的传播范围。该建议周岁尤其适用于以下人群：
 - 65 周岁以下的、罹患慢性病的 Covid-19 重疾高危¹ 易感人群；
 - 养老院、护理院和老年日托机构的 65 周岁以下的居民和被护理人员。
 - 与患者直接接触的卫健工作人员以及易感人群的护理人员。
 还建议从怀孕的三个阶段中的第二个阶段起的孕妇以及哺乳期的妇女追打疫苗加强针。
- 年龄从 12 至 15 周岁的青少年
如果他们想增强对感染和轻症的保护力度并降低给密接者 (家庭成员) 的传播风险，建议他们追打疫苗加强针。

何时应该追打疫苗加强针？

建议在全面完成基本免疫的 4 个月后追打一款 mRNA 疫苗加强针。完成基础免疫是指

- 接种了两剂 mRNA 疫苗；或
- 确诊感染了新冠病毒 + 间隔至少 4 周后接种了一剂 mRNA 疫苗 (无论顺序如何)

如果在通过全面接种一款 mRNA 疫苗而完成基础免疫后被确诊受到新冠病毒的感染，则适用以下规则：

- 如果在完成基础免疫后的 4 个月内受到感染，建议在感染的 4 个月后再再追打疫苗加强针。
- 如果在完成基础免疫后的 4 个月之后受到感染，则通常且目前来说无需再追打疫苗加强针。

对于年龄从 12 至 15 周岁的青少年，如果他们在完成基础免疫的 4 个月之后被感染，则不建议他们追打加强针。

追打加强针时采用的是哪种疫苗以及哪种剂量？

原则上，应该追打与基础免疫时同款的疫苗。如果做不到，也可以使用另一款 mRNA 疫苗。如果在基础免疫时接种的是不同的 mRNA 疫苗，则可以在追打加强针时选用这两款中的任何一款。

对于年龄从 18 周岁至 29 周岁的人，建议他们优选周岁优先选择追打辉瑞 / BioNTech 疫苗。对于年龄从 12 周岁至 17 周岁的人，建议他们追打辉瑞 / BioNTech 疫苗。

使用辉瑞 / BioNTech 疫苗时，追打加强针时的剂量与基础免疫接种时的剂量相同。而使用莫德纳疫苗时，则追打加强针时的剂量要减半。

我可以去哪里接种？

由各州政府负责疫苗的接种事宜。请通过您所在州的官方网站或信息热线 (www.foph-coronavirus.ch/cantons) 了解您进行登记和疫苗接种的地点。或询问您的医生或药剂师。

有关追加接种疫苗的其他信息与基础免疫接种的相同，具体请参见题为《*有关为 Covid-19 接种一款 mRNA 疫苗的一般信息*》须知。

¹ mRNA 疫苗接种建议第 11 页表 2: 针对患有慢性病的高危人群的疾病定义