



## Dopunska vakcinacija sa mRNA vakcinom (Pfizer/BioNTech, Moderna)

Od teškog toka bolesti Covid-19 i boravka u bolnici veoma dobro ste zaštićeni mRNA vakcinom. U zavisnosti od starosnog doba i varijante virusa, zaštita vakcinom vremenom se može smanjiti. Zaštita od blage bolesti i od prenošenja virusa, vremenom se smanjuje kod svih osoba. U zavisnosti od varijante, ovo može da se odvija brže ili sporije. Stoga preporučujemo dopunsku vakcinaciju za sve osobe starije od 12 godina.

### Čemu služi dopunska vakcinacija?

Sa dopunskom vakcinacijom imuni sistem se podseća na patogen. Povećana zaštita vakcinacijom se obnavlja i produžuje.

### Kome se preporučuje dopunska vakcinacija?

Dopunska vakcinacija se preporučuje svim osobama starijim od 12 godina.

#### • Osobe od 65 godina

Za njih dopunska vakcinacija u prvoj liniji služi za najbolju moguću zaštitu od teškog toka bolesti Covid-19 uz hospitalizaciju. Posebno za:

- osobe preko 75 godina;
- osobe preko 65 godina sa hroničnim bolestima sa najvećim rizikom<sup>1</sup> od teškog toka bolesti Covid-19;
- stanovnike i negovatelje u staračkim domovima, domovima za starije i bolesne osobe i ustanovama sa dnevnom negom starijih osoba.

#### • Osobe od 16 do 64 godina

Dopunska vakcinacija pomaže povećanju zaštite od infekcija i blažih, kao i ređih težih tokova bolesti i njihovih posledica (npr. dugoročnih posledica Covid-19, odsustva sa posla). Takođe može doprineti i privremenom smanjenju cirkulacije virusa. Preporuka naročito važi za:

- posebno ugrožene osobe preko 65 godina sa hroničnim bolestima sa najvećim rizikom<sup>1</sup> od teškog toka bolesti Covid-19.
- stanovnike i negovatelje u staračkim domovima, domovima za starije i bolesne osobe i ustanovama sa dnevnom negom starijih osoba.
- Zdravstveni radnici sa direktnim kontaktom sa pacijentima i osoblje koje se brine o osobama koje su posebno ugrožene.

Dopunska vakcinacija se preporučuje i trudnicama od 2. trimestra trudnoće i dojiljama.

#### • Mladi od 12 do 15 godina

Za njih se dopunska vakcinacija preporučuje kada žele da povećaju zaštitu od infekcije i blažeg toka bolesti i da smanje rizik od prenosa infekcije na bliske kontakte (članovi domaćinstva).

### Kada treba vršiti dopunsko vakcinisanje?

Dopunska vakcinacija se može vršiti 4 mesec nakon kompletne osnovne imunizacijem RNA vakcinom. Potpuna osnovna imunizacija postoji nakon

- dve doze mRNA vakcine; ili
- potvrđene infekcije korona virusom + jedna doza mRNA vakcine u intervalu od najmanje 4 nedelje (bez obzira na redosled).

Ako je infekcija korona virusom potvrđena nakon pune osnovne imunizacije sa mRNA vakcinom, u tom slučaju važi sledeće:

- Kod infekcije u roku od 4 meseca od osnovne imunizacije, preporučuje se dopunska vakcinacija 4 meseca nakon ove infekcije.
- Kod infekcija nakon više od 4 meseca nakon osnovne imunizacije, po pravilu trenutno nije potrebna dopunska vakcinacija.

Mladima, starosti između 12 i 15 godina, kod kojih je do zaražavanja došlo 4 meseca od potpune osnovne imunizacije, dopunska vakcinacija se ne preporučuje.

### Koja vakcina i u kojoj dozi se koristi za dopunsku vakcinaciju?

U principu, za dopunsku vakcinaciju treba koristiti istu vakcinu kao i za osnovnu imunizaciju. Ako ta nije dostupna, može se koristiti i druga mRNA vakcina. Ako su za osnovnu imunizaciju korišćene različite mRNA vakcine, dopunska vakcinacija se može izvršiti jednom od te dve vakcine.

Osobama starim između 18 i 29 godina preporučuje se dopunska vakcinacija po mogućnosti vakcinom kompanije Pfizer/BioNTech. Osobama od 12 do 17 godina preporučuje se dopunska vakcinacija vakcinom Pfizer/BioNTech.

Vakcina od Pfizer/BioNTech daje se za dodatnu vakcinaciju u jednakoj dozi kao i za osnovnu imunizaciju. Kod vakcine Moderna za dopunsko vakcinisanje se daje polovina doze.

### Gde i kada se mogu vakcinisati?

Za vakcinisanje su odgovorni kantoni. Informišite se na internet stranici ili na informativnoj liniji u svom kantonu ([www.foph-coronavirus.ch/cantons](http://www.foph-coronavirus.ch/cantons)), gde možete da se prijavite i vakcinišete. Ili pitajte svog lekara ili farmaceuta.

**Ostale informacije za dopunsku vakcinaciju su iste kao i za osnovno imuniziranje i možete ih pročitati na letku «Opšte informacije o vakcini protiv COVIDA-19 mRNA vakcinom».**

<sup>1</sup>Tabela 2, str. 11 preporuka mRNA-vakcina:

Definicije bolesti za osobe sa hroničnim bolestima sa najvećim rizikom (na nemačkom)

