



معلومات عامة حول التطعيم ضد كوفيد 19 بلقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA (فايزر/بيونتيك، موديرنا)

هل اللقاح آمن وفعال؟

أي لقاح يُستخدم في سويسرا يلزم أن يحصل أولاً على ترخيص وتوصية. ولتحقيق هذا يجب أن يفي بمتطلبات عالية من حيث السلامة والفعالية والجودة. قام المعهد السويسري للأدوية Swissmedic بفحص لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA ضد كوفيد-19 بدقة وقام بترخيصها. منذ أن تم الترخيص للقاح تم إعطاء عدة مليارات من الأشخاص بهذه اللقاحات. فهي آمنة وفعالة. أخذ عشرات الآلاف من الناس اللقاحات أثناء فترة الدراسات. كما أثبتت اللقاحات أنها آمنة وفعالة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. يجب أن تفوق فوائد التطعيم المخاطر المرتبطة به بشكل واضح. عندها فقط يوصى بهذا التطعيم ويواصل المتخصصون مراقبة سلامة وفعالية اللقاحات.

أين يمكنني أخذ اللقاح؟

وضعت الحكومة الاتحادية استراتيجية للتطعيم وتوصيات متعلقة به. الكانتونات هي المسؤولة عن التطعيم. استعلم عن أماكن التطعيم سواء على موقع الإنترنت أو من خلال خط المعلومات الخاص بالكانتون الذي تسكن فيه (www.bag-coronavirus.ch/kantone). أو اسأل طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه.

لمن يوصى بأخذ التطعيم؟

نوصى بأخذ تطعيم كوفيد-19 بلقاح mRNA لكل شخص بدءاً من سن 12 عام.

تنطبق هذه التوصية بشكل خاص على

- الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا (المصابين بأمراض مزمنة معينة، والأشخاص بدءاً من سن 65 عاماً، والنساء الحوامل)؛
 - بالإضافة للأشخاص المخالطين لهم في محيطهم الخاص أو المهني.
- نوصى بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً باللقاح الخاص بالأطفال من فايزر/بيونتيك

من يجب ألا يأخذ لقاح mRNA؟

لا نوصي بتطعيم الأشخاص الآتية ضد كوفيد-19 بلقاح mRNA:

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة مؤكدة تجاه أي من مكونات اللقاحات، وخاصة البولي إيثيلين جلايكول (PEG) أو ثلاثي أمينو الميثان (TRIS). هناك أيضاً أنواع أخرى من اللقاحات. يرجى التشاور مع أخصائية الحساسية أو أخصائي الحساسية.
- الأطفال والشباب دون سن 5 سنوات. فحتى الآن لا توجد بيانات كافية عن أخذ اللقاح في هذا العمر.

يرجى مراعاة الآتي: هل تعاني من حمى شديدة؟ هل أنت مريض وتشعر بتوعك؟ في هذه الحالة قم بتأجيل موعد تلقي اللقاح. خذ اللقاح بعد ذلك في أقرب وقت ممكن.

ماذا علي أن أفعل إذا كنت حاملاً أو كنت أرغب في الحمل؟

هل تخططين للحمل؟ إذن، فلتحصلي على التطعيم في أقرب وقت ممكن. هل أنت حامل بالفعل ولم تحصلي على التطعيم قبل الحمل؟ في الحالة المثالية ننصح بالحصول على التطعيم بدءاً من الأسبوع الثاني عشر للحمل (أي بدءاً من الثلث الثاني من الحمل). إلا أنه يمكن أيضاً من حيث المبدأ الحصول على التطعيم قبل ذلك.

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل ولديك استفسارات حول التطعيم فتحدثي إلى طبيبك أو طبيبتك أو القابلة. كما يمكنك أيضاً الحصول على معلومات في الصيدليات ومراكز التطعيم بهذا الخصوص.

كيف يتم أخذ اللقاح؟

ستأخذ حقنة في أعلى الذراع.

بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، يجب عليك البقاء للمراقبة في مركز التطعيم لمدة 15 دقيقة من التطعيم.

كم مرة يجب أن أتلقى فيها اللقاح؟

على وجه العموم، ستحتاج إلى جرعتين من التطعيم الأساسي. يمكنك أخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد أربعة أسابيع من أخذ الجرعة الأولى. قم بأخذ جرعتي اللقاح. إذا أصبت بالفعل وبشكل مؤكد بعدوى فيروس كورونا فستحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح mRNA للتطعيم الأساسي.

تنطبق الاستثناءات على الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة؛ استفسر لدى طبيبتك أو طبيبك.

ينصح بأخذ الجرعة التنشيطية من اللقاح لجميع الأشخاص بدءاً من سن 12 عاماً بعد إتمام 4 أشهر من التطعيم الأساسي الكامل (انظر النشرة «جرعة تنشيطية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA»).

كيف يحميني اللقاح؟

يقوم جسمك بتطوير أجسام مضادة تحميك من فيروس كوفيد-19. يستغرق هذا نحو أسبوع أو أسبوعين بعد الجرعة الثانية من اللقاح. يعمل اللقاح على تقوية جهاز المناعة لديك. ويساعد جسمك على مقاومة الفيروس. يقلل التطعيم بشكل كبير من خطر الإصابة الشديدة بمرض كوفيد-19. من المهم أن تعرف ذلك: لا يمثل اللقاح حماية مطلقة من الإصابة. بالنسبة للمتحوّرات الفيروسية الحالية، لا يمنح التطعيم سوى درجة قليلة من الحماية من

العدوى والأمراض الخفيفة ولمدة قصيرة فقط. فقد تصاب بمرض كوفيد-19 بالرغم من أخذ اللقاح. قم بإجراء الاختبار على الفور إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد-19. تجد هنا المزيد من المعلومات التفصيلية عن كيفية عمل اللقاح: www.bag-coronavirus.ch/mrna

إلى متى يحميني اللقاح؟

توفر لقاحات mRNA الحماية بشكل جيد من الإصابات الشديدة بمرض كوفيد 19 التي تتطلب الإقامة في المستشفى. ومع ذلك، فإن درجة الحماية للتطعيم الأساسي تقل بشكل أسرع مع المتحورات الفيروسية الحالية، لهذا السبب ننصح كافة الأشخاص ابتداءً من سن 12 عامًا بأخذ جرعة تنشيطية من اللقاح بعد مرور 4 أشهر من أخذ الجرعة الكاملة للقاح. تزيد الجرعة التنشيطية الحماية ضد الأمراض الخطيرة ومدة الحماية (أنظر النشرة «الجرعة التنشيطية»).

هل يمكن أن أصاب بمرض كوفيد-19 بسبب أخطي للقاح؟

لا. لأن تصاب بمرض كوفيد-19 بسبب اللقاح. لا توجد فيروسات كورونا في اللقاحات.

هل ينبغي أن أحصل على اللقاح إذا سبق لي إصابتي بفيروس كورونا؟

يعتبر اللقاح مفيداً أيضاً إذا أصبت بعدوى فيروس كورونا في السابق. ننصح بتلقي التطعيم حتى تكون محمياً من الإصابة على المدى الطويل. احرص قدر الإمكان على التطعيم في غضون ثلاثة أشهر من الإصابة. بعد أربعة أسابيع من الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، تكفي بشكل عام جرعة واحدة من اللقاح لغرض التطعيم الأساسي.

هل توجد آثار جانبية؟

منذ أن تم الترخيص للقاح تم إعطاء عدة مليارات من الأشخاص بهذه اللقاحات، ومن الواضح أن فوائده تفوق مخاطره. مع كل جرعة من اللقاح قد تظهر آثار جانبية. إلا أنها تكون في أغلب الأحيان خفيفة إلى معتدلة وتختفي بسرعة. من النادر جداً حدوث آثار جانبية شديدة. عانى بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي شديد بعد التطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح mRNA. في حالات نادرة جداً تمت ملاحظة التهابات في عضلة القلب أو التامور (غشاء القلب) خلال 14 يوماً من التطعيم، حيث كانت خفيفة في أغلب الحالات وكان من الممكن علاجها بشكل جيد. بالنسبة للأشخاص دون 30 عاماً، تمت ملاحظة هذه الالتهابات بشكل أكثر بعد تطعيمهم بلقاح موديرنا. لذلك يوصى أن يتلقى الأشخاص في عمر أقل من سن 30 عاماً التطعيم الأساسي بلقاح فايزر/بيونتيك. ينطبق على اللقاحين ما يلي: تفوق فوائد تطعيم كوفيد 19 أيضاً بالنسبة للأشخاص الصغار في العمر المخاطر المحتملة. تحدث التهابات في عضلة القلب أو التامور (غشاء القلب) أيضاً بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا. باستثناء هذا حتى الآن لا توجد حالات لافتة للانتباه لآثار جانبية خطيرة. من المتوقع حدوث مثل هذه الآثار الجانبية، في غضون بضعة أشهر من أخذ اللقاح. يراقب الخبراء المتخصصون الإشارات المحتملة لذلك عن كثب.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

- موضع الزراع الذي تم أخذ الحقنة فيه يتعرض للاحمرار أو الألم أو التورم.
- الصداع
- الشعور بالإعياء
- آلام في العضلات والمفاصل
- أعراض عامة مثل القشعريرة أو الشعور بالحمى أو الحمى الخفيفة

تظهر هذه الآثار الجانبية في المعتاد بعد أخذ اللقاح. تشير هذه الأعراض إلى أن الجسم بدأ في تكوين الحماية ضد المرض.

في حالة رد الفعل التحسسي، يحدث، على سبيل المثال، تورم أو احمرار شديد أو حكة أو ضيق في التنفس بعد أخذ اللقاح مباشرة. الأعراض المعتادة لالتهاب عضلة القلب هي ألم في الصدر، وضيق في التنفس، والخفقان الشديد بالقلب وعادة ما تحدث هذه الأعراض في غضون أسبوعين من التطعيم. توجه إلى طبيبك أو طبيبك على الفور في حالة حدوث مثل هذه الأعراض.

إلى متى يمكن أن تستمر الآثار الجانبية؟

تختفي الآثار الجانبية في المعتاد بعد بضعة أيام. هل لا يزال لديك آثار جانبية بعد مرور أسبوع؟ هل تزداد سوءاً؟ أو هل أنت قلق؟ عندئذ تحدث مع طبيبك أو طبيبك.

من سيدفع تكلفة اللقاح؟

اللقاح مجاني بالنسبة لك. يدفع التأمين الصحي جزء من تكلفة التطعيم، وتغطي الدولة والكانتونات باقي التكلفة.

هل أخذ اللقاح اختياري؟

نعم. أخذ اللقاحات اختياري في سويسرا.

أين أجد مزيداً من المعلومات؟

تجد مزيد من المعلومات حول لقاح كوفيد-19 على موقع الإنترنت الخاص بالمكتب الاتحادي للصحة:

www.foph-coronavirus.ch/vaccination

أو اسأل طبيبك أو طبيبك. أو في الصيدلية.